

Bs Dược Thảo Hoàn M -


1. Giới thiệu

Bệnh lý thảo luận kinh độ dày - ruột do đái tháo đường (ĐTĐ), được chia thành hai nhóm chính: bệnh lý thảo luận kinh độ dày - ruột (bệnh lý thảo luận kinh độ dày - ruột ngoại biên) và bệnh lý thảo luận kinh độ dày - ruột (bệnh lý thảo luận kinh độ dày - ruột trung tâm) (bệnh lý thảo luận kinh độ dày - ruột khi nào hoạt động của các cơ quan như dạ dày, ruột, tim mạch, hệ tiêu hóa).

Trong các biện chứng thảo luận kinh độ dày - ruột, Liệt độ dày là biện chứng hay gặp và bệnh lý thảo luận kinh độ dày - ruột của người bệnh ĐTĐ.

Liệt độ dày (hay còn gọi là chứng rối loạn tiêu hóa) là một rối loạn khi ăn thức ăn đi vào dạ dày và lưu lại lâu hơn sinh lý bình thường, bởi vì các dây thần kinh đi u khi nào sẽ di chuyển thức ăn qua đường tiêu hóa bình thường và các cơ hoạt động yếu đi, nên làm chứng hoạt động đường tiêu hóa bình thường. Hầu như đều do rối loạn chức năng ăn uống gây ra trong dạ dày lâu hơn và không được tiêu hóa bình thường.

Bệnh liệt độ dày do Đái tháo đường (ĐTĐ) là một biện chứng của bệnh Đái tháo đường (ĐTĐ), được trình bày ở sơ đồ làm rõ ràng độ dày không kèm theo các nghiên cứu [1]



[Xem tiếp đây](#)

Bản chỉ ng th n kinh d dày - ru t do ái tháo đ ng

Vi t b i Biên t p viên
Th ba, 26 Tháng 9 2023 19:55 -
